

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian disimpulkan bahwa:

1. Tidak terdapat interaksi antara jenis alas kandang dan kepadatan kandang terhadap bobot hidup, bobot karkas, persentase karkas, persentase lemak abdomen, itik Pitalah jantan umur 10 minggu.
2. Kepadatan kandang sangat nyata mempengaruhi bobot hidup, berat karkas, dan persentase karkas, tetapi tidak berpengaruh terhadap persentase lemak abdomen.
3. Jenis alas kandang tidak mempengaruhi bobot hidup, bobot karkas, persentase karkas, persentase lemak abdomen.
4. Bobot hidup, berat karkas, persentase karkas dan persentase lemak abdomen yang terbaik dalam penelitian ini yaitu pada perlakuan B1 (3 ekor/0,3 m²) yaitu sebesar 890,13 gram/ekor, 503,13 gram/ekor, 56,00% dan 0,131%.

5.2 Saran

Untuk mendapatkan bobot hidup yang lebih baik, sebaiknya ukuran kandang yang digunakan untuk itik Pitalah umur 10 minggu adalah (3 ekor/0,3m²), sehingga pertumbuhan itik tidak terhambat dan itik yang berada di dalam kandang yg sesuai dapat beraktivitas dengan baik.